



### **Buitre negro**

**Longitud:** 110 - 115 cm.

**Envergadura:** 250 - 295 cm.

**Peso:** 7.500 - 12.500 g.

**Monfragüe:** 311 parejas

**Extremadura:** 725 parejas

**En Monfragüe:**

La Báscula

La Híguerilla

**Descripción:** la mayor rapaz ibérica. Tono general del plumaje muy oscuro, sobre todo en los jóvenes. Se distingue del Buitre leonado, por ser más oscuro, por la cola más larga y de extremo algo en punta. La cabeza es menos saliente y, en conjunto, da una impresión más rectangular y de mayor robustez. Existen algunas diferencias entre los adultos y los jóvenes: los adultos tienen el collar marrón claro y las partes descubiertas de la cabeza son de un color azulado; los jóvenes tienen el collar negro y las partes descubiertas de la cabeza rosadas.

**Nidificación:** cría en colonias poco densas que se extienden a lo largo de varios kilómetros, siempre sobre árboles. Los nidos se encuentran siempre en la parte más alta del árbol para facilitar el despegue y aterrizaje y pueden llegar a medir hasta dos metros de altura y otros dos de diámetro.

**Reproducción y crianza:** las puestas se llevan a cabo entre los meses de febrero y marzo y consisten en un solo huevo que es incubado principalmente por la hembra. Dura 52 - 54 días, con lo que el nacimiento de los pollos se extiende desde primeros de abril a finales de mayo. Vuelan por primera vez hacia los cuatro meses de edad. Los jóvenes emprenden una vida errática y adquieren la madurez hacia los cinco o seis años.

**Hábitat:** principalmente montañas y sierras cubiertas de bosque o de matorral denso con árboles dispersos. En ocasiones la ubicación de sus colonias podría estar en relación con antiguas cañadas de trashumancia.

**Desplazamientos:** los adultos son sedentarios. Los jóvenes son erráticos.

**Alimentación:** cadáveres de animales pequeños, medianos y grandes. Su radio de acción puede extenderse a 30 o 40 km. de su zona de cría. Invierte de 7 a 11 horas al día en buscar alimento.